

# Zomerstalvoeren

## = Vers gras voeren op stal

Bij zomerstalvoeren worden koeien op stal gevoerd met vers gras dat dagelijks machinaal geoogst wordt. Het gras wordt gemaaid bij een drogestofopbrengst van ongeveer 2000 kg DS per ha, en hierna liefst meteen opgeraapt in 1 werkgang.

### Waarom?

+ Voordelen	- Nadelen
Minder krachtvoer nodig	Arbeidsintensief (dagelijks)
Meer eiwit van eigen land	Vereist vakmanschap
Betere benutting najaarsgras	Investeringskosten
Geen beweidings-, inkuil- en conserveringsverliezen	Hogere brandstofkosten dan bij begrazing
Verlaagt loonwerkkost	Mestopslag
Geen weide-afrastering nodig	Vereist flexibiliteit vanwege de weersinvloeden
Weilanden verder van de deur kunnen ook benut worden i.t.t. begrazing	Variatie in graskwaliteit en beschikbaarheid -> rantsoen frequent bijsturen
Hoogste voederwaardeopbrengst per ha (in vergelijking met begrazen of maaien en inkuilen)	



## Waarmee rekening houden?

### Weidevoorbereiding:

- Bemest correct:
  - Geef een ruime drijfmestgift voor de eerste snede. Na de latere snedes kan dan regelmatig een beperktere gift worden gegeven. Zo blijft het gras smakelijk en hoog kwalitatief. Om smaakbederf na een drijfmestgift verder te voorkomen, kan er wisselend gemaaid worden voor inkuilen en voor zomerstalvoeren.
- Sleep om oneffenheden, molshopen en dus verontreiniging met aarde te vermijden.
- Zorg voor groeitrappen



### Afstelling machines:

- Gebruik een bandenspanning van maximaal 0,8-1,0 bar, tegen bodemverdichting
- Maaihoogte: ca 7 à 8 cm voor een goede hergroei
- Zo min mogelijk beschadigen van het gras om broei te vermijden.
  - Gebruik bij voorkeur geen kneuzer.
  - Juiste afstelling van de pick-up bij opraapwagen of gebruik bij voorkeur een maailaadwagen zodat het gras niet op de grond komt.
  - Zorg bij het lossen van het gewas voor een egale luchtige verdeling in de voergang.



### Planning:

- Zorg voor een constant aanbod vers gras
- Het groeiseizoen is soms onvoorspelbaar, maar probeer vooruit te kijken. Pas je planning dan ook aan als je in een minder groeizame periode dreigt te raken.
- Schakel naar een nieuw blok als het gras te lang wordt. Elders wordt het gras ook langer en bovendien kan je het teveel inkuilen.
- Probeer een rotatieduur van 4 weken aan te houden, afhankelijk van de grasgroei.
- Maai op het meest geschikte van de dag. De droge stof en suikergehalte nemen namelijk toe tijdens de dag. Rond 14 u piekt het DS-gehalte in droge omstandigheden. Maaien op dit moment zal zorgen voor minimaal risico op bederven van het gras.
- Probeer het gras droog in de stal te krijgen om broei te vermijden. Maai bij wisselvallig weer tussen de buien door.

